



Mindmore

Digitale kognitive tester i en demensutredning

Jens Berggren, Leg. Psykolog
Jens@mindmore.com

Utmaningar

- Tidig upptäckt
- Bristande kunskap
- Saknar verktyg



Vad är Mindmore

- Digitala självadministrerande kognitiva test
- Mäter fem domäner
- Personcentrerad testning
- Egna normer (18-93år)
- Rekommenderat av SKR

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom


Vårdförloppet inleds vid misstänkt och kognitivt svikt orsakat av demenssjukdom
och avslutas vid bekräftat diagnos, återställt då misstänkt inte bekräfts

Rekommendationer för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Detta vårdförlopp är utvecklat enligt den nationella riktlinjen för vård och stöd vid demenssjukdom och är ett exempel på ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Det är viktigt att den vård som ges är anpassad till den enskilda patientens behov och önskemål. Vårdförloppet är utvecklat för att stödja patienter med misstänkt demenssjukdom och kognitivt svikt. Vårdförloppet är utvecklat för att stödja patienter med misstänkt demenssjukdom och kognitivt svikt. Vårdförloppet är utvecklat för att stödja patienter med misstänkt demenssjukdom och kognitivt svikt.



Vad är Mindmore





Epostadress

test@testsson.se

Lösenord


.....

Visa

Logga in



Kognitiv profil




Detaljerade resultat

Exekutiv funktion	Poäng	Nivå	Percentil	z-poäng	Index	Test	Status
Mental flexibilitet	0.11	Något låg	13	-1.15	83	TMT B	✓
Impulskontroll	9.4	Medel	40	-0.25	96	STROOP	✓
Ordflöde	56	Över medel	83	0.96	114	FAS	✓
Domänresultat		Medel	44	-0.15	98		

Domänresultat för varje domän

Standardpoäng är färgkodad för snabb överblick



FAS Transkriptioner

F	S	A
flygmaskin	slut	arbete
farkost	stiga	aktivitet
fiske	stessa	anslag
fotografi	situation	absolut
fallskärm	sak	astronom
fyrkant	sax	adjektiv
fabrik	skrivbord	acceptera
fysik	socionom	annorlunda
filosofi	samtala	alltid
färg	sia	annorstädes
ful	sömmerska	affekt
fusk	symaskin	ankare



Underlätta administration

Summering för journalföring

Resultat av kognitiv testning:

Minne: Genomsnittligt

Uppmärksamhet och tempo: Klart över genomsnittet

Exekutiv funktion: Genomsnittets övre del

Verbal funktion: Genomsnittligt

Resultat av skattningsskalor:

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire - 9): 4/27. Indikerar inga eller milda depressiva symptom.

GAD-7 (Generalised Anxiety Disorder - 7): 4/21. Indikerar inga eller mycket milda orossymptom

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale): 22/54. 19 poäng eller högre indikerar risk för utmattningssyndrom.

Klinikern har möjlighet att anpassa utlåtandet med avseende på:

- Mängd information
- Skalar
- Indikationer



Mindmores digitala kognitiva tester

Boston Naming Test short version (BNT-15) (Kaplan et al., 1983; Jørgensen et al., 2017) – modifierad version

CERAD (Morris et al., 1989)

Clock Test (Shulman & Feinstein, 2003)

Continuous performance test (CPT) (Cynthia A. Riccio et al., 2001)

Corsi's tapping test (Corsi, 1972)

FAS Test (Benton & Hamsher, 1976)

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) (Gronwall, 1977) – modifierad version

Reaction Time Test (Dykiert et al., 2010; Nissan, Liewald & Deary, 2013) – modifierad version

Rey's Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (Rey, 1964; M. Schmidt, 1996)

Stroop test (Victoria version) (VST, Regard, 1991) – modifierad version

Symbol Digit Modalities Test (SDMT) (Smith, 1982)

Token Test (De Renzi & Vignolo, 1962)

Tower of Hanoi (Simon, 1975)

Trail Making Test (TMT A+B+D) (US Army, 1944)

3D Cube copying Test (Necker, 1832)

Även
statningsskalor

ASRS-v1.1 Screener
ASRS-v1.1 Symptoms Checklist
PHQ-9
GAD-7
KEDS
MADRAS
FAQ


Sammanfattning

Kognitiva sjukdomar måste utredas tidigt!

Vården behöver bättre verktyg

Spara tid och resurser för vården

Öka kunskapen om kognition



Demo

