


INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER:

GALANTAMIN



LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne.

Exempel på läkemedel med olika namn men som innehåller det verksamma ämnet galantamin är: **Reminyl, Galantamin Actavis, Galantamin Mylan, Galantamin Krka, Galantamin Orion, Galantamin Sandoz, Galantamin STADA.**

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER GALANTAMIN?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER GALANTAMIN?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Depotkapslar innehållande galantamin tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.
- Kapslarna är utformade som depotkapslar, vilket innebär att det verksamma ämnet frisätts i långsam takt i tarmen. Därför ska kapslarna sväljas hela, och får inte tuggas eller krossas.
- Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.
- Kapslar brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

VAD GÖR MAN OM MAN:

- **Glömt att ta en dos?**

Om du glömmet bort att ta en kapsel, ta en kapsel nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmet flera doser, eller om du ofta glömmet bort att ta din medicin, kontakta din behandlande mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

- **Tagit dubbel dos?**

Hoppa över den nästkommande ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt.

Känner du något obehag ska du kontakta läkare.

VILKA BIVERKNINGAR KAN GALANTAMIN GE?

En del personer får biverkningar av galantamin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring, och dålig aptit. Som regel är dessa biverkningar övergående.

Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR GALANTAMIN?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan.

Kombinationen alkohol och galantamin är inte specifikt studerad.

VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH FEBER KAN JAG TA MED GALANTAMIN?

För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. Panodil, Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol (t. ex. Citodon, Panodil, Alvedon). Äldre personer bör undvika läkemedel innehållande ibuprofen (t. ex. Ipren, Ibumetin), diklofenak (t. ex. Voltaren), acetylsalicylsyra (t. ex. Treo), nabumeton (Relifex), naproxen (t. ex. Pronaxen) om man inte blivit rekommenderad dessa av läkare.

HUR SKA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER GALANTAMIN FÖRVARAS?

Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling.

Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Framtagen av:

Hälsostaden Ängelholms sjukhus

Enheten för Kognitiv Medicin, Specialistminnesmottagningen

Reviderad: Januari 2016, Emmy Andersson, apotekare

www.skane.se

